

A(-5|?|?) liegt auf der Geraden $g: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \\ 0 \end{pmatrix}$.

P liegt ebenfalls auf g und hat von A den Abstand 6. Berechnen Sie die Koordinaten von P.

A BERECHNEN

Aus $x = -5 = 1 + 6t$ erhalten wir $t = -1$ und für A: $\begin{pmatrix} 1 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A(-5|2|3)$

P BERECHNEN: 1. ART

Der Richtungsvektor der Geraden hat die Länge $\sqrt{36 + 64 + 0} = 10$

\vec{v} sei ein dazu paralleler Vektor der Länge 6: $\vec{v} = 0.6 \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.6 \\ -4.8 \\ 0 \end{pmatrix}$

Damit gilt für die gesuchten Punkte P: $\vec{OP} = \vec{OA} \pm \vec{v} = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} 3.6 \\ -4.8 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} P_1(-1.4|-2.8|3) \\ P_2(-8.6|6.8|3) \end{matrix}$

P BERECHNEN: 2. ART

P ist ein variabler Punkt auf g : $P(-5 + 6t | 2 - 8t | 3)$.

Daraus berechnen wir $\vec{AP} = \begin{pmatrix} -5 + 6t \\ 2 - 8t \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6t \\ -8t \\ 0 \end{pmatrix}$

\vec{AP} soll die Länge 6 haben: $\sqrt{(6t)^2 + (-8t)^2 + 0} = 6$
 $100t^2 = 36$
 $t^2 = 0.36$
 $t_{1,2} = \pm 0.6$

Einsetzen in $P(-5 + 6t | 2 - 8t | 3)$ ergibt: $\begin{matrix} P_1(-1.4|-2.8|3) \\ P_2(-8.6|6.8|3) \end{matrix}$